

Invasiivisten toimenpiteiden jatkohoito-ohjeet potilaalle

Rintojen kohotus ja Rintojen kohotus myös rintojen suurennuksella

Viivyt sairaalassa	1 yö, lisää tarvittaessa
Ensimmäinen jälkitarkastus	2.–3. viikolla
Toinen jälkitarkastus	3. kuukausi
Poistetaan siteet ja drenit	2. päivänä
Voit käydä suihkussa	5. päivänä
On käytettävä tukevia alusvaatteita	3 kuukautta yöllä ja jopa 6 kuukautta päivällä
Laastarit on vaihdettava	3–4 viikon ajan
Voit mennä töihin	2–3 viikon kuluttua
Voi esiintyä turvotusta ja mustelmia	3–5 viikon ajan
Vältä raskasta työtä	1–2 kuukautta
Vältä sukupuoliyhdyntää	1 kuukausi
Tikit sulavat pois	4–6 viikon kuluttua
Poistetaan langat	2. ja 4. viikolla
Älä tupakoi	1 kuukausi
Voit mennä saunaan	1 kuukauden kuluttua
Voi esiintyä kudosten tuntoherkkyyden vähenemistä	6–12 kuukautta
Voit arvioida lopputulosta	12 kuukauden kuluttua
Suojaa ihoa UV-säteilyltä	1 vuoden ajan