

Invasiivisten toimenpiteiden jatkohoito-ohjeet potilaalle

Pakaroiden kohotus ja Pakaroiden kohotus implantilla

Viivyt sairaalassa	enintään 2 yötä
Ensimmäinen jälkitarkastus	1.–3. viikolla
Toinen jälkitarkastus	3. kuukausi
Poistetaan siteet ja dreenit	2.–3. päivänä
Voit käydä suihkussa	päivästä 2
Sinun on käytettävä tukisidettä	2 kuukauden ajan
Käytä laastareita	1–2 kuukauden ajan
Voit siirtyä seisomatyöhön	2 viikon kuluttua
Voit siirtyä seisomatyöhön	4 viikon kuluttua
Voi esiintyä turvotusta ja mustelmia	4–6 viikon ajan
Vältä raskasta työtä	enintään 3 kuukautta
Vältä sukupuoliyhdyntää	2 kuukautta
Tikit sulavat pois	6–8 viikon ajan
Älä tupakoi	1 kuukausi
Voit mennä saunaan	3 kuukauden kuluttua
Voi esiintyä kudosten tuntoherkkyyden vähenemistä	enintään 1 vuosi
Voit arvioida lopputulosta	6 kuukauden kuluttua
Suojaa ihoa UV-säteilyltä	1 vuoden ajan
Lisäinformaatio	korkean infektioriskin takia on varmistettava asianmukainen hygienia