

Käitumisjuhend: Botuliintoksiini süstid

Vastunäidustused:

- rasedus ja imetamine
- neuromuskolaarsed haigused
- palavik
- herpes

Võimalikud kõrvalnähud:

- paistetus
- punetus
- pigmentatsioonihäired
- ebatasasus
- verevalum

2 nädalat enne	Hoidu laserravist, keemilisest koorimisest ja teistest nahaprotseduuridest, et vältida põletiku tekkimist.
1 nädal enne	Loobu aspiriini ja muude verd vedeldavate ravimite nt Ibuprofeni, Paratsetamoli või Hjertemagnyli manustamisest.
48 tundi enne	Viimane võimalus tühistada protseduur.
6 h möödudes	Võib pesta süstitud piirkonda.
12h jooksul	Võib esineda peavalu. Hoidu raskest füüsilisest pingutusest.
24h pärast protseduuri	<ul style="list-style-type: none">▪ Võib tekkida väike punetus, paistetus, ja sügelus ravitud piirkonnas. Paistetuse vastu aitab sellele jääkoti asetamine.▪ Hoidu süstitud piirkonna katsumisest, et vältida aine kandumist teistesse lihastesse.▪ Hoidu alkoholi joomisest.▪ Kaitse nahka UV-kiirguse eest. Juhul, kui tekib hematoom, tuleb UV-kiirguse eest kaitsta 1-2 nädala jooksul.
48 h jooksul	Loobu aspiriini ja muude verd vedeldavate ravimite nt Ibuprofeni, Paratsetamoli või Hjertemagnyli manustamisest.
1 nädala jooksul	<ul style="list-style-type: none">▪ Võib esineda süstitud piirkonda ümbritsevate lihaste lõtvust. Peopesade süstide puhul võib esineda lihasnõrkust ja kohmakust käelabadel. Silmaümbrussüstide puhul võib esineda silmalaugude alla vajumist.▪ Hoidu laserravist, keemilisest koorimisest ja teistest nahaprotseduuridest, et vältida põletiku tekkimist.
1-2 nädalat	Võib tekkida verevalum, mille resorbeerumine kestab 1-2 nädalat.