

## Инструкции для пациента: Инъекции ботулотоксина

### Противопоказания:

- беременность и период лактации
- нейромускулярные расстройства
- температура
- герпес

### Возможные побочные эффекты и осложнения

- отеки
- покраснение
- нарушение пигментации
- неровность
- гематомы

За 2 недели	Воздержитесь от лазерной терапии, химического воздействия, и прочих процедур с кожей, чтобы исключить возможность воспаления.
За неделю	Отказаться от аспирина и других разжижающих кровь препаратов, как Ibuprofen, Paratsetamol или Hjertemagnyl.
За 48 часов	Последняя возможность отменить операцию
Через 6 часов	Можно мыть место инъекции.
В течение 12 часов 24 часа после	Возможна головная боль. Воздержитесь от тяжелых физических нагрузок. <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Возможны покраснения, припухлости, и почесывание. Против опухания используйте мешочек со льдом.</li><li>▪ Не трогайте район инъекции во избежании попадания вещества на другие мышцы.</li><li>▪ Воздержитесь от алкоголя и попадания ультрафиолета.</li><li>▪ В случае возникновения гематомы, остерегайтесь ультрафиолета 1-2 недели.</li></ul>
48 часов после	Отказаться от аспирина и других разжижающих кровь препаратов, как Ibuprofen, Paratsetamol или Hjertemagnyl.
В течение недели	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Возможна дряблость мышц вокруг места инъекции. В случае инъекции в ладони может появиться слабость и неуклюжесть кистей рук. При инъекциях в окологлазной области возможно обвисание век.</li><li>▪ Воздержитесь от лазерной терапии, химического воздействия, и прочих процедур с кожей, чтобы исключить возможность воспаления.</li></ul>
1-2 недели	Возможен кровоподтек, чье рассасывание может занять 1-2 недели