

Toimenpiteiden jatkohoito-ohjeet potilaalle

Botuliinitoksiini-pistokset

6 h kuluttua	Voit pestä hoidettua aluetta.
12 h aikana	Saattaa esiintyä päänsärkyä. Vältä raskasta fyysistä ponnistusta.
24 h toimenpiteen jälkeen	<ul style="list-style-type: none">▪ Hoidetulla alueella saattaa syntyä hieman punoitusta, turvotusta ja kutinaa. Turvotuksen lievitykseen auttaa jääpussi.▪ Älä kosketele hoidettua aluetta, välttääksesi aineen kulkeutumista muihin lihaksiin.▪ Älä nauti alkoholia.▪ Suojaa ihosi UV-säteilyltä. Jos syntyy hematooma, on iho suojattava UV-säteilyltä 1-2 viikon aikana
48 h aikana	Lopeta aspiriinin ym. verta ohentavien lääkkeiden, esim. ibuprofeenin, parasetamolin tai hjertemagnylin käyttö.
1 viikon aikana	<ul style="list-style-type: none">▪ Voi esiintyä hoidettua aluetta ympäröivien lihasten velttoutta. Jos pistokset on tehty kämmenpohjaan, voi esiintyä lihasheikkoutta ja kömpelyyttä kämmenissä. Silmänympäryspistosten jälkeen silmäluomet saattavat hieman laskeutua.▪ Vältä laserhoitoa, kemiallista kuorintaa ym. ihonhoitomenetelmiä, välttääksesi tulehduksen.
1-2 viikkoa	Saattaa syntyä verenpurkauma, jonka resorbointi kestää 1-2 viikkoa.