

# Как следует себя вести после проведения процедуры

## Инъекции ботулотоксина

Через 6 часов	Можно мыть место инъекции.
В течение 12 часов	Возможна головная боль. Воздержитесь от тяжелых физических нагрузок.
24 часа после	<ul style="list-style-type: none"><li>Возможны покраснения, припухлости, и почесывание. Против опухания используйте мешочек со льдом.</li><li>Не трогайте район инъекции во избежании попадания вещества на другие мышцы.</li><li>Воздержитесь от алкоголя и попадания ультрафиолета.</li><li>В случае возникновения гематомы, остерегайтесь ультрафиолета 1-2 недели.</li></ul>
48 часов после	Отказаться от аспирина и других разжижающих кровь препаратов, как Ibuprofen, Paratsetamol или Hjertemagnyl.
В течение недели	<ul style="list-style-type: none"><li>Возможна дряблость мышц вокруг места инъекции. В случае инъекции в ладони может появиться слабость и неуклюжесть кистей рук. При инъекциях в окологлазной области возможно обвисание век.</li><li>Воздержитесь от лазерной терапии, химического воздействия, и прочих процедур с кожей, чтобы исключить возможность воспаления.</li></ul>
1-2 недели	Возможен кровоподтек, чье рассасывание может занять 1-2 недели