

Käitumisjuhend: Lipolüüs

Vastunäidustused:

- rasedus ja imetamine
- psoriaas
- palavik
- herpes

Võimalikud kõrvalnähud:

- paistetused
- punetus
- hematoomid
- pigmentatsioonihäired
- muutused lokaalses vereringes

1 nädal enne	Loobu aspiriini ja muude verd vedeldavate ravimite nt Ibuprofeni, Paratsetamoli või Hjertemagnyli manustamisest.
48 tundi enne	Viimane võimalus tühistada protseduur.
6 tunni möödudes	Võib pesta süstitud piirkonda.
48 tunni jooksul	Loobu aspiriini ja muude verd vedeldavate ravimite nt Ibuprofeni, Paratsetamoli või Hjertemagnyli manustamisest.
3 päeva jooksul	Hoidu saunast, massaažist, spordist. Võib esineda iiveldust ja kõhulahtisust.
4 päeva jooksul	Võib esineda paistetust, tundlikkust, punetus, sügelust. Tursete ja hematoomide tekkimisel ei tohi kasutada jääkotti, sest toimeaine reageerib temperatuurile.
5 päeva jooksul	Masseeri ravitud piirkonda umbes 5 minutit ning viiel korral päevas.
2-4 nädala jooksul	Ravitud piirkonnas võib esineda hüperpigmentatsioon.
Kuni 1 kuu jooksul	Võivad esineda kerged muhud ja mügarikud.