

Инструкции для пациента: Склеротерапия

Противопоказания:

- беременность и период лактации
- аллергия на препарат
- синдромы тромбофилии
- ожирение
- герпес

Возможные побочные эффекты:

- гематомы
- рельефные покраснения на коже
- небольшие язвенные поражения на коже
- гиперпигментация
- микрососудистая реакция

Данные побочные эффекты исчезают в течение пары дней – пары недель после проведения процедуры.

Побочные эффекты, требующие последующего лечения

Воспаление	Небольшое воспаление может вызвать отек, ощущение жара и дискомфорта на обработанном участке.
Тромб	В обработанной вене может возникнуть застоявшийся сгусток крови, тромб, для ликвидации которого требуется пункция засклерозированной вены и эвакуация внутрисосудистой гематомы. В очень редких случаях тромб может проникнуть в глубокие вены, что может привести к легочной эмболии. При затруднении дыхания, головокружении, кашле с кровью и боли в грудной клетке незамедлительно свяжитесь с врачом.
Воздушная эмболия/воздух в крови	Попадание пузырьков воздуха в систему кровоснабжения может вызвать нарушение зрения, головную боль, кашель, тошноту, которые должны пройти в течение небольшого промежутка времени. При онемении и проблемах с подвижностью конечностей незамедлительно свяжитесь с клиникой.
Аллергическая реакция	может возникнуть у пациентов с повышенной чувствительностью к склерозирующим препаратам. О реакции следует немедленно сообщить в клинику.
За два дня до В день процедуры	Воздержитесь от алкоголя и табака <ul style="list-style-type: none">▪ Не брейте ноги▪ Мойте ноги антибактериальным мылом▪ Не мажьте ноги кремом▪ Носите широкие штаны и удобную обувь Легко перекусите за 1.5 часа до процедуры
Сразу после 48 после	Ходите 30 минут в удобной одежде Нельзя снимать давящие чулки и пластыри
В течение недели	Воздержитесь от физических нагрузок и спорта Ходите 2 минуты 3–4 раза в день
Через 2 недели В течение 2 недель после процедуры	Можно брить ноги и натирать кремом Необходимо немедленно начать использовать поддерживающие чулки: Тип II класс, среднее давление 17-23mm/Hg Не снимать в течение первых 48 часов, затем использовать в течение дня
1 месяц после процедуры До выздоровления	Закройте область от солнца, чтобы предотвратить гиперпигментацию После склеротерапии человек может продолжать свою повседневную деятельность, только воздержаться от горячих ванн и сауны