

Инструкции для пациента: Гелевые инъекции

Противопоказания:

- аллергия на лидокаин
- беременность и период лактации
- губной герпес
- температура

Возможные побочные эффекты и осложнения:

- отеки
- покраснение
- тепло чувствительность
- легкое воспаление вокруг место инъекции
- нарушение пигментации
- неровность
- гематомы
- нечувствительность кожи

За 2 недели	Воздержитесь от лазерной терапии, химического воздействия, и прочих процедур с кожей, чтобы исключить возможность воспаления.
За неделю	Отказаться от аспирина и других разжижающих кровь препаратов, как Ibuprofen, Paratsetamol или Hjertemagnyl.
48 часов	Последняя возможность отменить операцию.
До 6 часов после	Не трогайте район инъекции
Через 6 часов	Можно мыть место инъекции.
12 часов после	Можно делать make-up
1-2 дня	Возможны покраснения, припухлости, и почесывание. Против опухания используйте мешочек со льдом.
24 часа	Отказаться от аспирина и других разжижающих кровь препаратов, как Ibuprofen, Paratsetamol или Hjertemagnyl.
48 часов	Беречь кожу от ультрафиолета (или до рассасывания гематом)
В течение 1 недели	Возможна отечность, результат может казаться непропорциональным.
В течение 2 недель	Воздержитесь от лазерной терапии, химического воздействия, и прочих процедур с кожей, чтобы исключить возможность воспаления.
До исчезновения покраснений и припухлостей	Нельзя загорать и ходить в сауну